Les injeccións intra-articulars en el tractament de les artritis seques

pel Dr. LLEÓ FORMIGUERA, de Barcelona

Hi ha un cert número de malalts afectes d'artritis seca, en els qui les superficies articulars són llises o bé presenten excrecencies que per lo reduit de llur tamany no constitueixen un gros obstacle mecànic que impideixi els moviments. Això pod apreciar-se amb els raigs X.

En aquests pacients s'acostuma a fer un tractament general tònic i exempt de tòxics i un tractament local a base de moviments i massatges per a favorir la circulació, i electricitat per a aumentar la tonicitat muscular

Si ademés d'això se lograva interposar un sustitut de la sinovia desaparescuda que separés un poc les superficies articulars i favorí's llur desllisament, és mólt probable que s'obtinguessin resultats mólt millors que no s'obtenen ara.

Fa mólts anys, Bier va intentar fer injeccións intraarticulars de substancies grasses esterelitzades. Jo suposava que no devíen donar un gran resultat, perqué, malgrat d'haver-los publicats els fets i del temps transcorregut, el métode no s'ha generalitzat. N'obstant vaig aplicar-la dúes vegades, una al genoll i un altra a l'articulació escàpulo-humeral empleiant com a substancia la vasselina fusible a 45° i degudament esterelitzada.

Acabada de fer l'injecció, les malaltes notaren una marcada

facilitat de moviments que durá unes quantes hores: després sobrevingué un dolor difús que les obligá a estar al llit i que desaparegué en 24 hores per la de la escàpulo-humeral i durá 4 díes per la del genoll. Un cop passat el dolor, quedaren totes dúes com avans de ma intervenció.

Suposo que'l fet és degut a que la vaselina s'havia absorbit.

¿Qué succeïría si en lloc de vasselina s'injectés un liquid animal? Segurament s'obtindrien millors resultats. Proximament intentaré injectar sinovia d'articulacións de gossos, amb el ben entés de que si per cas la que pogués extreure de les articulacións normals no fos suficient, aleshores primerament provocaria a dits gossos una artriti amb derrame, ja per medi d'un traumatisme o bé valent-me d'injeccións intra-articulars de substancies irritatives.

Si per cas la sinovia d'animals també és reabsorvía podrien provocar-se bursitis agudes al mateix pacient en una bossa de poca importancia i extreure el líquid d'allí per a injectar-lo a l'articulació afecta.