

INFECCIO PER VIH A ADICTES A DROGUES PER VIA PARENTERAL DE L'AREA DE BARCELONA. 1984-1987.

J TOR, R MUGA, JM LLIBRE, B CLOTET, A RIBERA*, R MELUS,
C GINESTA, C REY-JOLY, M FÓZ.

UNITAT DE MALALTIES INFECCIOSES. SERVEI DE MEDICINA INTERNA I
SERVEI DE HEMATOLOGIA I HEMOTERAPIA *.
HOSPITAL DE BADALONA "GERMANS TRIAS I PUJOL".
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

S'ha analitzat la presència d'anticossos contra el virus de l'immunodeficiència humana (VIH) a 442 adictes a drogues per via parenteral (ADVP) del 571 que varen ésser atesos al nostre centre per distintes causes al període Març-1984 / Novembre-1987.

La mostra era formada per 443 varons (75.5%) i 128 dones (24.5%), amb una edat mitjana de 23.5 anys (que oscil.lava de 15 a 42 anys) i un temps d'adicció mitjà de 43.4 mesos (oscil.lant de 1 a 167 mesos). Un 26% dels casos varen venir per malaltia infecciosa aguda, el 54% per a tractament de la seva adicció i el 20% restant per altres causes mèdiques o quirúrgiques.

Un 73.9% (327/442) dels casos presentaven anticossos Anti-VIH (ELISA), amb una incidència similar per a ambdós sexes. L'incidència anual augmenta constantment desde 1984, encara que la magnitud d'aquest augment anual, del 10% entre 1984 i 1985, tot just arriba a un 2% de 1986 a 1987 (el 1984 61.9% positius, 71.3% el 1985, 75.7% el 1986 i 76.2% el 1987).

Prop del 90% del casos ha compartit xeringues de forma esporàdica (42.7%) o habitual (47.4%), si bé aquest hàbit disminueix desde 1985 (62.5% les compartia habitualment) fins 1987 (42.4% les comparteix habitualment). De l'escàs nombre de malalts (36/361; 10%) que nega haver compartit mai el material d'injecció, la mitat ha iniciat el seu hàbit d'adicció el 1987 i el 47.6% son seropositius. Aquesta seropositivitat assoleix el 73.4% i el 72.1% dels casos que refereixen compartir les xeringues esporàdica o habitualment, respectivament ($p = 0.0525$). L'incidència d'infecció augmenta amb el temps d'adicció, amb un 29.2% de seropositius amb menys de 6 mesos d'adicció i un 79.4% de positius amb més de 2 anys d'adicció ($p < 0.0001$). La presència d'anticossos contra el VIH augmenta ràpidament a partir dels 6 mesos / 1 any d'adicció.