

INDICACIONS I TÉCNICA DE LA PERINEORRAFIA IMMEDIATA SECUNDARIA

pel Dr. BOI GUILERA

Metge numerari de la Maternitat de Barcelona

La necessitat, millor que la conveniència, de procedir a la reparació *immediata* dels esguinços del periné consecutius al part, és per tothom reconeguda i està fonamentada.

1.^{er} En l'*utilitat pròxima* que reporta el suprimir una causa d'oportunitat morbosa: l'esguinç de periné, per insignificant que sia, representa sempre una porta oberta a l'infecció, i

2.^{on} En l'*utilitat tardana* que dóna el tornar a la seva normalitat l'estàtica perinial suprimint així un factor preponderant en la gènesi i desenrotlle de la quasi totalitat de les desviacions patològiques de l'*úterus* i modalitats diferents del prolapse, encara tant freqüentment observats en la pràctica diària.

La freqüència dels prolapses, quin factor inicial i *princeps* fou un descuidat esguinç del periné consecutiu al part, testimonia l'imperfecta cultura obstètrica d'un país.

Existeixen, no obstant, fets i condicions d'ordre *local* unes i d'ordre *general* altres que fan impossible el compliment *immediat* d'aquesta indicació: tals són en el 1.^{er} grup les infiltracions edematoses dels teixits perinials (per albuminúria o edema tòxic o inflamatori), trombus vulvo-vaginals extesos cap al periné i la certa septicitat de la regió o de la partera i el descobriment de l'existència d'un esguinç més o menys extens, passat inadvertit o descuidat després de les primeres 24 hores.

Entre les contra-indicacions a la sutura immediata per causes d'ordre general podem senyalar l'eclàmpsia i les hemorragies greus, i en general tot estat de pròxim perill greu o extrema debilitat de la malalta.

Totes aquestes contra-indicacions a la reparació immediata esdevenen, així com el fracàs de la mateixa, altres tantes indicacions de la perineorrafia immediata secundaria.

Sa possitiva valúa fà, al meu entendre, més de dordre que meritíssimes obres d'Obstetricia passin per alt l'indicació i estudi de dita intervenció, així com tampoc pue suscriure les reserves que formula en Pozzi en el seu tractat de Ginecología al preguntar-se si «quan no s'ha pogut cosir immediatament convé practicar dè de el primer mes la reunió immediata secundaria que s'ha propost. Així, diu, han pogut obtindre's alguns èxits, emprò té més inconvenients que ventatges».

Faure fà constar sos nombrosos èxits, mes afegeix que té també alguns inconvenients i aquests són l'hostilitat de la partera a acceptar una intervenció quina necessitat no capeix prou bé i ve a perturbar el repós de son puerperi. En aquestes condicions, diu, sovint més val esperar que passi el període puerperal i refeta de les fadigues físiques i morals, així com ben enterada i convençuda dels inconvenients d'abandonar el tractament del seu esguinç accepta l'intervenció en les millors condicions per a l'èxit.

El meu parer, valgui lo que valgui, si és que val alguna cosa, és absolutament favorable a intervenir sense esperar la cicatrització; aprofitar el repós de la partera, que sòls veurà allargat d'uns cuants dies més amb l'operació, allavors senzilla, sense necessitar avivament i desdoblament de teixits amb estisores i bisturí, curta i assequible moltes vegades a l'anestesia local.

Els èxits són la regla, escullint el moment oportú, i si no alcancessem el fi proposat, per ventura hauríem perdut rés al intentar-ho?

De l'octau al quintzé dia, em sembla la millor ocasió per a portar-la a terme.

Es condició primordial per l'èxit la *preparació* de la ferida, mai devém intentar cosir-la si no és satisfactori l'aspecte o vitalitat dels teixits.

1.^{er} *Técnica*.—Preparació de la regió: rentats amb solució salina normal calenta, tocs amb iode o essencia de trementina en les clapes mortificades és el meu habitual procedir, no tinc experiència personal del brou làctic, vantat per en Jeannin.

Un citrat de magnesia o bé oli de ricí la vigília i un clisteri

amb aigua bullida i dúes cullerades d'aigua oxigenada 4 hores abans de l'operació.

Posició de la dòna, protecció del camp operatori, instrumental, etc., idèntic a lo recomenat per a la perineorrafia primària.

2.^{ón} *Avivament*.—En els cassos senzills es pot fer rapidísimament i en veritat es suficient l'anestesia local obtinguda per l'anestidermína o la stovaina al 2 % emprò en els esguinços extensos de 2.^{ón} i en els de 3.^{er} grau crec preferible l'anestesia general.

La cullereta tallant de Volckmann és el millor mitjà per a obtenir un avivament ràpit i suficient per a una bona coaptació, amb pinces de dissecció i estisores curves repolaritzarém els marges de la ferida i allavors procedirém al cosit exactament igual que si's tractés d'una perineorrafia immediata.

3.^{er} *Sutura*.—Crec equivocada l'opinió d'en Bumm i altres patrocinadors de la seda per a aquestes sutures.

Per a la reconstitució del esguinç rectal el catgut n.º 1, i quan la sutura de l'anell esfínteríà així com també per a la paret vaginal posterior el catgut n.º 2 em sembla mólt més ventatjós que la seda.

Per a la sutura del periné, propiament dit, el crin de Florencia és el mitjà ideal.

4.^{rt} *Tractament post-operatori*: Retirat el lleuger taponament vaginal aplicat al començar per a mantenir neta la regió operatoria, deixém una tira de glassa iodoformada o al peroxid de zinc com a drenatge vaginal que retirém a les 24 hores, un lleuger toc amb tintura de iode sobre la ferida del periné, rés de polsos antissèptics i cura i envenat usual en aquests cassos.

Rés de particular a senyalar en els cuidados post-operatoris en un tot idèntics als indicats per a la perineorrafia immediata.

Durant aquests últims mesos ha sigut practicada amb éxit complet en tres cassos en la Maternitat. En el 1.^{er} ho fou als 14 dies i el motiu sigué el fracás de la sutura immediata; en el 2.^{ón} ho fou als 16 dies i per idèntic motiu, i en el 3.^{er} ho fou al 8.^é dia a una partera primipara com les anteriors que tingué un part sense assistència en posició ajupida entre dúes cadires i no sigué tractat l'esguinç.

En tots aquests cassos es tractava d'esguinços de 2.^{ón} grau: el 2.^{ón} cas fou operat pel meu company Dr. Roig-Raventós i els altres dos pel comunicant.