

CARACTERISTIQUES DE LA GANGRENA PULMONAR POST GRIPAL I SES INDICACIONS QUIRÚRGIQUES. NOTA CLÍNICA

pel Dr. E. RIBAS i RIBAS

Amb motiu de les últimes epidèmies gripals hem tingut de intervenir en 5 casos de neumònia gangrenosa i tots ells han presentat símptoma clínic que els separen de tots els altres casos de gangrena pulmonar i caverne originades per altres causes.

Els casos per nosaltres vistos presentaren tots després de infecció gripal més o menys intensa, un començament agut caracteritzat per fort dolor en la part alta del pit amb irradiacions cervicals i braquials; en tots persistí el dolor fort intens en el braç corresponent al pulmó malalt. L'evolució en tots ha sigut lenta, fosca, sense ésser possible diagnosticar la lesió anatomo-patològica de bon principi ni amb auxili de la radiografia la que acusava una zona més o menys fosca, irregular. Sols radiografies posteriors acusaren les lesions pròpies de les caverne pulmonars indicant tal evolució un procés destructiu i progressiu.

Tots els casos presentaren hemoptisi i temperatures elevades de tipus remitent i irregular. En 4 dels casos citats espectoració fètida.

La localització del procés fou en la part alta del pulmó en tots els casos, extesa des de la 1.^a a la 4.^a, 5.^a i 6.^a costella i caracteritzada de bon principi per macidesa i disminució del murmur vesicular i tan sols al final després de mesos d'evolució fou possible trobar signes cavitaris.

Aquest conjunt sindròmic característic de la neumònia gangrenosa gripal el devem tenir present per no arribar tardivolment a una indicació quirúrgica com passà en els casos citats dels que sucumbiren 3 a pesar de la intervenció.

Apart l'estat de postració que porta en si tot procés greu i llarg no oblidem que la neumònia gangrenosa és progressiva i cada hora que es pert una nova zona pulmonar és destruïda.

La indicació no deu consistir sols en el drenatge de la caverna sinó en taponar-la bé amb gassa antissèptica, nosaltres en els últims casos empleàrem gassa embadurnada amb pomada a base de bàlsam del Perú, eucaliptus, iodoform. La pneumotomia i el drenatge sols no deturen la difusió de la gangrena.