

PRESENTACIÓ DE CASOS DE LUPUS TUBERCULÓS A LA CARA DE CRIATURES

pel Dr. R. BARCELÓ ESTIVILL

Condol veure una criatura, i més encara si és una nena, amb cicatrius a la cara que la desfigurin i que ja gran en passa fonda pena, pel natural sentiment de la dona en voler ésser bonica i sense defectes de cap mena; però molt més l'apenaria si pensés que aquelles cicatrius el metge les hauria pogut curar o deixar-les força atenuades.

Doncs heu's aquí el motiu de presentar als companys congressistes aquests casos de *lupus tuberculós* en la infància, malgrat no sigui cap novetat, ja que tots sabem que el tractament empleat en aitals casos, la *tintura de iode* està aconsellat de moltíssims anys.

Sols m'he proposat fer remarcar la diferència de cicatrització entre aquests casos que tenim a l'observació i en els que segurament no quedarà rastre de cicatriu amb el temps, i la de molts altres que veiem ben sovint i les cicatrius dels quals no sols no desapareixen mai, sinó que enlletgeixen la cara de la criatura, motivat, sens dubte, pels tractaments ràpids i enèrgics.

*
* *

És veritat que, per a obtenir semblants resultats en els casos que presento, es necessita alguna paciència, car la duració de dit tractament ha sigut de mig any com a mínim i arribant

a un any i mig com a màxim; els resultats obtinguts, com podeu apreciar, són més que satisfactoris.

D'aquests tres casos, en dos d'ells ha sigut purament local; tocs de tinture de iode diàriament al començ, fins obtenir la completa modificació del procés i teixit morbós; més endavant, tocs en dies alterns procurant evitar sempre la *dermitis iòdica*, i respectant la crosta que es forma per efecte del tractament i esperant son natural desprendiment, apareixent aleshores la pell neta i sense llaga ni cicatriu; si encara queden sospites de què la malaltia no està ben curada, per a major seguretat segueixo amb alguns tocs més, però de lluny en lluny i segons sigui l'estat del procés.

Sols a un d'ells he associat al tractament local una solució d'arseniat, alternant-lo periòdicament amb una altra de iodur potàssic a l'exterior.

En uns dels tres casos—el nen més petit que, degut a una entremaliadura infantil, va arrencar-se la crosta abans de temps—aparegué una lleugera llaga que retrassà sa curació i deixà més marcat senyal; així i tot, és tant superficial—com es pot veure—que abans de dos anys sols en quedarà una superfície isquemada difícil d'apreciar a simple vista.

*
* *

Tinc la plena seguretat de que aquests infantons ara petits, quan siguin grans, i jo ja mort!! en contemplar-se ses rialleres carones i es recordin de mi no ho faran pas amb recança, sinó amb molt agraïment, que és sens dubte la millor paga i recompensa que puc esperar d'una societat que, generalment, és amb el metge massa desagraïda!!

Discussió: Dr. Peyrí.

Dels tres casos presentats pel Dr. Barceló n'hi ha un de curat, el que data de més temps; els altres porten encara els lupomes però porten una bona marxa.

La terapèutica càustica local i la terapèutica iòdica especial que ha usat el Dr. Barceló és útil però no resol tots els casos; usar els mitjans càustics és ajudar amb l'escara a eliminar el

lupoma i de fet elimina i acaba certs lupus petits, circumscrits, però no tots i sobre tot els extensos; en aquest cas i si el doctor Barceló no acaba d'aquí uns mesos els altres dos casos li recomanaria la terapèutica física que arriba on no arriben els recursos químics.

Rectificació: Dr. Barceló.

Pel referit pel Dr. Peyrí sols em cal manifestar que els dos últims casos presentats estan encara en tractament, per no considerar-los absolutament curats.