

gue de defensa ha passat a orgue d'atac i per tant deu suprimir-se la causa d'intoxicació.

El millor és fer la colectomia subtotal per sota de l'angle esplènic, mai per damunt, no usant el botó de Murphy i practicant la sutura termino-terminal.

DR. J. BARTRINA.

DR. J. TRIAS PUJOL.

*Discussió: Dr. F. Gallart.*

Insisteix en el seu criteri francament quirúrgic, creient l'hemicolectomia l'operació d'elecció.

*Discussió: Dr. E. Ribas i Ribas.*

En cada cas i mercès a l'estudi de l'anatomia patològica devem cercar la causa i no confondre-la mai amb l'efecte.

Referma les opinions dels Drs. BARTRINA i TRIAS referents les del primer a la importància de la retracció mesentèrica i les del segon a les lesions primitives del sistema neuro-muscular del budell.

*Discussió: Dr. Puig Sureda.*

Distingeix dos tipus; el de patogènia mecànica i el neuro-muscular. El primer deu tractar-se per desaiguament, drenatge, etc.; el segon per la ressecció, però solament en casos ben definits; en els casos borrosos, intermitjos, és difícil la terapèutica i precisament són aquests els que cal estudiar en el successiu.

*Rectificació Dr. Bartrina.*

Afirma haver vist lesions macroscòpiques mesentèriques primitives que han envaït el budell i són una de les causes d'E.I.C.

L'estómac, pot desplaçar-se totalment, contra l'opinió d'alguns autors, perquè l'angle duodeno-jejunal pot perdre la seva

fixesa per manca de coalescència, però en aquests casos no hi ha estasi gàstrica i per tant creu que encara que l'E. I. C. sembli de causa mecànica ha d'haver-hi alguna cosa més, inclinant-se a creure que elements d'origen hemàtic alteren les fibres neuro-musculars, opinió que té contacte amb la del Dr. TRIAS.

*Rectificació: Dr. J. Trias Pujol.*

Les alteracions mesentèriques del Dr. BARTRINA tenen llur origen en la mucosa, però curant aquesta, queda la lesió mesentèrica com a *primum movents*.

Al·ludeix a l'opinió del Dr. GARTES; de Buenos Aires, que dóna gran importància a la sífilis en l'etiologia de l'estasi.