

## UN CAS D'IMPERFORACIÓ ANAL I URETRAL EN UN NEN ACABAT DE NÉIXER

pel Dr. J. SAU

Farà cosa de mig any, que a les deu de la nit, me portaren al despatx un nen nascut vintiquatre hores abans en un poble veí (Vilallonga de Ter), molt esverats perquè en dit temps no s'havia embrutat, ni orinat tampoc, ja no volia mamar i se temia versemblantment una pròxima mort de l'infant, m'escau dir, tot seguit que en l'acte del naixement, cap de les dones que acostumen assistir a les parteres en dit poble (on no hi ha llevadores titulades), havien mirat si la criatura estava ben conformada, a la primera muda no donaren importància al fet de la sequedat de les robes, però a la següent, veient que continuava eixut i coincidint amb greu malestar de la criatura, buscaren i trobaren la causa en un tapament complet del forat anal, prenent tot seguit la determinació de portar-me'l, per si podia posar-hi remei.

El petit en el seu aspecte era sà i robust, de tamany gros, però tenia un veritable aire de sofriment, amb plecs a la pell de la cara i de color fosc terrós; ja no plorava, després d'haver-ho fet molt, ni tampoc volia mamar; una volta desfaixat vaig comprovar una forta tivantor de les parets del ventre i ràpidament vaig cercar la causa de tan greu trastorn.

No es oportú, per altra part prou sabut, d'explicar les moltes varietats que pot oferir una imperforació anal des d'una forma molt senzilla, fins la més complicada, però sempre totes per anomalies en l'evolució de la constitució anatòmica d'aquesta regió; descriuré lo que es presentava en el meu cas.

En la regi  anal no es veien pas els replecs que sempre hi fa la pell, tot era llis, si b  al tacte donava la impressi  d' sser m s tou o buit, en el punt on corresponia el forat, que en les altres parts, i en la paret anterior-perineal, en la l nia mitja o baixa s'hi notava una verruga o exeresc ncia ben petita, vermella com un mamell ;  s davant d'aquesta que vaig portar la intervenci ; fou ben senzilla i r pida; amb el bistur  vaig fer un tall seguint la l nia mitja, d'un parell de cent metres i ben poc fondo, amb la sonda acanalada vaig apretar el fons de la ferida i prompte sent  el buit del budell; amb l'estisora eixampl  un xic i amb el dit vaig acabar la maniobra; el meconi va sortir; vaig rentar la ferida i res m s, perquè no ho vaig creure necessari i tamb  perquè quasi tenia el convenciment que havia fet una operaci  in til, donat l'estat del petit malalt; sense anest sia de de cap mena.

Llavors vaig mirar els genitals, puix tampoc havia orinat, segons deien, i aix  ja es feia m s estrany, puix si b  el ventre era gros, no presentava pas l'immensa dilataci  de la bufeta que diuen els autors que han pogut observar casos de retenci  urin ria al naixement; al meu examen, realment els llen olets eren ben eixuts; a la vista presentava el pene tamb  certa anomalia, puix semblava m s curt i retor at; la pell no cobria pas el glande, semblava un parafimosi, sense extrangulaci , m s aviat la pell sobrava pels costats b  que estava afegida per sobre el teixit peni : la regi  del frenell estava al descobert i tivanta, no veient-hi cap forat, encar que feia tot aix  en condicions ben defectuoses i r pides. El meat efectivament era tapat per una pel l cula que amb la punta del bistur  vaig obrir agrandint amb la sonda el pas; vaig amb la mateixa sonda profunditzar, va semblar me que topava i cedia f cilment altre obstacle, arribant fins quasi a l'uretra, sortint ja orina, no en molta quantitat precisament; faig la neteja corresponent i despedeixo al malaltet, fent-me un greu pron stic, puix tenia la convicci  que es moriria ben aviat.

Durant els vuit dies seg ents va passar, segons me contaren, per diverses alternatives, creient-lo perdut per complet moltes vegades; en tal data, aprofitant l'anada a dit poble per altres malalts, vaig tornar a veure la criatura, comprovant a la meva visita, el molt que havia perdut del seu estat general i a pesar de tenir resolt satisfact riament el motiu principal de la seva malaltia, no me'l cregu  salvat del tot; refent en aquesta

oportunitat el meu examen, principalment dels genitals, vaig trobar en la regió del frenell un foradet quasi microscòpic, que tal vegada deixava sortir l'orina durant l'estada in-útero de la criatura; ara orinava bé pel meat; la part de l'anu estava completament normal.

Actualment ha reprès el nen la seva marxa normal ascendent, no quedant-li rastre de lo passat i tenint tot l'aspecte de la fortalesa dels petits pagesos.

Té una germaneta de cinc anys que nasqué sense cap defectuositat, així com sos pares i avis, que conec perfectament tampoc en pateixen.