

UN NOU ANTISEPTIC EN OTO-RINO-LARINGOLOGIA

pel Dr. R. ABELLÓ

Variadíssimes són les malalties infectives localitzades en els òrgans objecte de la nostra especialitat que es poden beneficiar i que es beneficien d'aquest antisèptic de què vaig a parlar-vos.

Mes com per tractar moltes d'elles ja es disposen de bons mitjans, sols vos parlaré avui dels efectes quasi increïbles que en l'otitis mitja supurada crònica he obtingut, convençut que fins ara amb cap tractament de tants com són preconitzats, podia arribar (i amb facilitat) a curar una tan gran proporcionalitat de malalts com s'arriben a curar amb la *lysine*.

Suposo que abans que el que vos parla, la *lysine* ja ha sigut empleada per altres especialistes, encara que llurs treballs i resultats són per a mi desconeguts. Per tant vaig a referir-me solament a malalts de la meua clientela i als que acudiren al servei d'Oto-rino-laringologia de l'Hospital de la Santa Creu.

En el temps de 3 mesos, 46 malalts amb otitis mitja supurada crònica sense ésser escollits, han sigut tractats amb rentats de *lysine* núm. 4 al 5 o 10 %. D'ells nou estan en tractament des de menys de quatre setmanes, dels 37 restants, tres malalts m'han desaparegut, un no s'ha curat després de 3 mesos de *lysine* i ha quedat perfectament esgotada la supuració en els 33 restants en un període de temps oscil·lant entre 5 i 40 dies.

D'entre els casos curats n'hi ha tres tan remarcables que no puc resistir la temptació d'explicar-vos llur història clínica.

Càndida N. 15 anys. De Sarreal. Li foren extirpades les vegetacions adenoides quan era petita; repetides supuracions òtiques; se presenta amb otitis mitja crònica dreta que diu datar de tres mesos, amb un pòlip com una veça inserit a la part alta

i posterior de la caixa. Proposada l'extirpació del pòlip fou rebutjada i amb la més gran sorpresa per part meua la *lysine* va curar la malalta en 11 dies.

Josep A. 13 anys. D'Igualada. Supuració doble que data des dels 5 anys d'edat, o sigui portant 8 anys de duració; perforació enorme dels dos tímpanes especialment l'esquerre del qual sols resten residus voltant el mànec del martell. Fungositats. El tracto amb tots els mitjans ordinaris durant un any aproximadament; durant aquest període li extrec 3 pòlips de l'oïda dreta i 11 de l'esquerra, pòlips que es reproduïen amb facilitat; quan el començo a tractar amb *lysine* hi ha a l'oïda esquerra 3 pòlips petits com caps d'agulla i 1 com un pesolet a la dreta. Als 22 dies queda curada l'oïda dreta i als 40 l'altra oïda, amb la particularitat remarcable i que no m'explico que ambdós tímpanes han quedat cicatritzats; és dir, queden sense perforació.

Montserrat C. 29 anys. De Barcelona. Otitis mitja supurada del costat esquerre amb aticitis. La supuració data de 5 anys i haviasigut tractada durant alguns mesos per altres companys. Aquesta malalta no es cura amb 83 rentats de l'atíc a dies alterns amb alcohol bòric i amb *lysine* queda curada en 18 dies.

En resum: de 34 malalts amb distintes varietats d'otitis mitja supurada crònica, se n'han curat 33 amb *lysine* i en menys de 40 dies, o sigui una proporcionalitat quasi exactament de 97 %. Hi ha cap tractament amb el qual es pugui presentar sincerament una estadística semblant? Jo almenys confesso que no l'havia pogut obtenir.