

NOTA PREVIA SOBRE LA CAPACITAT CIVIL DEL PARALITIC GENERAL TRACTAT AMB MALARIA

Pels Drs. PONS BALMES I MIRA LOPEZ

Aquest tema ha de constituir l'objecte d'una ponència del pròxim Congrés d'Higiene Mental que es celebrarà en setembre a Saragossa.

Hem estudiat fins a la data dotze casos dels classificats com de remissió completa, baix el punt de vista de capacitat civil.

Dits casos presenten com analogia no tenir trastorns mentals evidents, l'haver estat retornats a llurs famílies; la majoria ha reemprès el seu treball anterior, i presenten bon estat general. Com a diferències presenten un nivell de cultura anterior a la malaltia diferent, formes clíniques diverses i diferent temps des del començament de la malaltia.

De tal estudi una primera conclusió és evident, la que en cap malalt han desaparegut conjuntament els símptomes mentals neurològics i humorals; per tant, en cap no pot parlar-se de curació; així és que en parlar de capacitat civil entengui's capacitat civil temporal.

Estudiats dits casos neurològicament resulta que presenten milloria dels símptomes que anomenarem inflamatoris, i a vegades desapareixen. Entenem per símptomes inflamatoris la disartria, els tremolors, la incoordinació motriu, reflexes exaltats, etc. Els símptomes pupillars (Argill, deformació, anisocoria) no sofreixen modificació, igual que els reflexes abolits. La milloria mental és tant més estable i accentuada, quan més milloren els símptomes inflamatoris, resultant en casos que a l'examen no hi han símptomes neurològics (ja perquè no existissin abans del tractament, com en casos precoços), presentar-se un estat normal a l'examen mental. En canvi, en cas de presisten-

cia de símptomes neurològics inflamatoris són freqüents les recaigudes.

Estudiat des del punt de vista humoral s'observa que en els casos millorats (i en els no millorats de forma estacionària, deguda a tractament tardà) disminució i a vegades normalització de cèl·lules, albúmina, i globulines, i tendència a negativació de Wassermann i reaccions coloidals. En quasi tots els casos millorats, les reaccions humorals tendeixen a establir-se i normalitzar-se; tota recaiguda va acompanyada de reactivació de les reaccions.

Relacionant l'exposat amb la capacitat civil, pot dir-se que la no remissió neurològica completa de símptomes inflamatoris, així com la persistència i accentuació de les reaccions de l'albúmina, globulines, i cèl·lules, són fets que ens informen de pròxima recaiguda; per tant, mal pronòstic, i que no modifiquen el criteri d'incapacitació del paralític general. En canvi l'estabilització dels símptomes neurològics i humorals, són de bon pronòstic quant a recaiguda, i per tant favorables a respectar la capacitat d'obrar.

Els resultats proporcionats per l'examen mental valguent-se de preguntes sobre coneixements generals orientació en l'espai i temps, judici, lògica i diferents tests d'atenció, memòria i intel·ligència donen els següents resultats:

Primer grup.—En tres casos els resultats són acceptables, més bé vulgars, sense que pugui dir-se que hi hagi dèficit. Dits casos corresponen a malalts el tractament dels quals ha estat molt precoç, presentant a penes trastorns mentals abans del tractament.

Segon grup.—En quatre casos els resultats són deficients, presentant trastorns de memòria, atenció, judici moral, i a les proves de lògica i intel·ligència. Tots presentaven deliris i trastorns mentals abans del tractament.

Tercer grup.—En cinc casos l'examen revela un dèficit mental molt gros. Tots també presentaren deliris i símptomes mentals abans del tractament.

Essent la integritat mental condició indispensable per la capacitat civil, resulta:

Pot respectar-se la capacitat civil en els malalts del primer grup, si bé deu fer-se un estudi de la seva capacitat professional en quant a l'elecció d'ofici.

Pot respectar-se la capacitat civil en els malalts del segon

grup, sempre que la seva professió no requereixi intel·ligència ni responsabilitat, i tenint en compte la seva posició social i béns que pogués administrar.

En el tercer grup deuen ésser incapacitats, permetent solament treballs que no requereixin intel·ligència ni activitat mental.

Resumint el dit en l'estudi de la capacitat civil del paralític general paluditzat deu tenir-se present:

Primera. Que és temporal, atenent a què és incurable, i per tant, pendent de recaiguda.

Segona. La capacitat civil sols pot obtenir-se en el paralític, amb tractament precoç.

Tercera. Que la desaparició de símptomes neurològics inflamatoris i l'estabilització i tendència a normalització de les reaccions humorals, és necessària, doncs en cas contrari, són freqüents les recaigudes.

Quarta. Que el resultat de l'examen mental deu ésser normal o amb poc dèficit.

Quinta. Un examen de re-orientació professional és necessari com a complement de l'examen mental.

Sexta. Que la posició social i professional i els béns que pugui administrar són dades a tenir en compte en l'estudi de la capacitat civil.