

NECESSITAT D'ACTIVAR LA LLUITA ANTICANCE- ROSA A CATALUNYA

pel

Prof. Lluís G. Guilera.

*Cap del Servei del Càncer de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.*

L'operabilitat en els casos de càncer de larinx observats al
Servei del Càncer de l'Hospital de la Santa Creu, ha estat aquesta:

<i>Anys</i>	<i>Casos observats</i>	<i>Operables</i>	<i>Operabilitat</i>
1930	17	1	7,46 %
1931	15	1	
1932	14	3	
1933	21	0	
	—	—	
Total	67	5	

L'operabilitat en els casos de càncer de larinx observats al
en el quadre que segeix:

<i>Anys</i>	<i>Casos observats</i>	<i>Operables</i>	<i>Inoperables</i>	<i>Operabilitat</i>
1930	68	23	45	33,8 %
1931	59	25	34	42 %
1932	48	18	30	37,5 %
1933	56	23	33	41 %
Totals	231	89	142	Mitja 38,5 %

Totes aquestes xifres han estat determinades per un sol i sempre el mateix observador. un altre observador, en el mateix Servei, pels 85 casos observats els anys 1926 i 27, havia trobat una operabilitat de 28,2 %. Deixant apart una possible desigualtat de rigor en l'apreciació de l'operabilitat, creiem que hi ha hagut realment una milloria, deguda segurament a la campanya popular que es va fer els anys 1925, a 29.

Amb tot, la xifra és més baixa que a Mun'ch, Prof. Döderlein-Voltz (anys 1912 a 23=40,8%); a Berlín, Prof. Bumm-Philipp (anys 1923-25=43,92%) a París, Prof. Regaud (any 1922=48%) etc. i està molt lluny de les donades per alguns que esmenten una operabilitat del 60 i més per cent.

En relació al càncer de la mama, han estat fetes al nostre Servei les observacions que ací veiem:

<i>Anys</i>	<i>Casos operats quins ganglis han estat estudiats</i>	<i>Número de ganglis examinats</i>	<i>Casos sense metàstasi histològica</i>	<i>Casos amb metàstasi histològica</i>
1931	7	39	3	4 %
1932	5	13	0	5 %
1932	14	45	4	10 %
Totals	26	97	7	19 %

Ha estat, doncs, comprovada l'existència d'adenopatia neoplàsica en 73% dels casos. La xifra és realment impressionant i cal tenir en compte, encara, que es refereix solament a casos operables, mentre que el 50% dels que ens arriben ni operables són.

El quadre que segueix es refereix a càncer del pene:

	<i>Amb ganglis his- tològicament no neoplàsics</i>	<i>Amb ganglis his- tològicament neo- plàsics</i>
Malalts operats de buidatge inguinal 10	7	3
Inoperables amb grossa adenopatia neoplàsica ...		8
Malalts irradiats profilàcticament (amb o sense adenopatia, la naturalesa exacta de la qual s'ignora)	10	
Malalts els que no ha calgut tractament inguinal	6	
Totals	23	11

En el millor dels casos, 32,35% dels malalts han presentat adenopatia segurament neoplàsica.

Quant al càncer del recte, l'operabilitat en 29 casos no ha arribat al 10%. Aquestes xifres indiquen millor que cap altra cosa com l'estat en què ens arriben els malalts al nostre Servei de l'Hospital i com n'és d'urgent la realització d'una campanya d'educació popular (cartells, fullets, films, conferències, articles en els periòdics, etc.) i de perfeccionament del metge (opuscles resumits amb normes per al diagnòstic precoç, conferències en els Hospitals, comarcals, cursets especials en els grans centres, etc. Obtenir la col·laboració dels professionals auxiliars del metge (llevadores, practicants, infermeres), dels farmacèutics i mestres, ens sembla també molt important. D'ací la conveniència que en la Facultat de Farmàcia, en els cursos de les carreres auxiliars de la Medicina i en les Escoles Normals, hi fossin donades conferències especials i, després, periòdicament remeses als estaments professionals publicacions adequades

Avui creiem que és al Departament de Sanitat del Govern de Catalunya a qui correspon portar la davantera en aquesta feina i molt ens plauria que el Congrés es dignés recomanar-ho així.