

EL PRIMER NEOSALVARSAN CATALÀ : RESULTATS CLÍNICS I EXPERIMENTALS

per

S. Noguer-Moré i J. Sarró

Els falaguers resultats obtinguts, després de les recerques experimentals dutes a terme pels professors Domingo i Bellido d'aquesta Facultat i Tello de l'Institut Nacional d'Higiene de Madrid, prop del nou neosalvarsan nacional anomenat "Neo Spirol", ens portaren a l'aplicació clínica i terapèutica del susdit compost, del qual podem donar, ara per ara, les següents conclusions:

1.^a—Hem emprat el nou compost en uns 60 malalts afectes de sífilis en diferents períodes, havent aplicat en total unes 500 injeccions venoses.

2.^a—*Al punt de vista clínic* podem afirmar que la influència resolutiva i de blanqueix obtinguda amb el nou compost durant el curs de lesions sifilitiques en plena activitat, ha estat tan brillant com l'obtinguda pel Neosalvarsan Standart Internacional.

3.^a—*Al punt de vista serològic*, per bé que encara una mica prematur, podem ja assenyalar: 1r.—Que les seroreaccions es modifiquen lleugerament al final del primer mes del tractament segons un tipus regular descendent. 2n.—Que hem assolit ja la negativació de les mateixes en alguns casos, especialment transcorregudes de 3 a 5 setmanes d'haver acabat la primera sèrie de 6 a 7'5 grams de Neo. 3r.—Que les reaccions que primer s'han negativat han estat la W i la M. T. T. 4rt.—Que, com en tots els Neos, en algun cas

les reaccions continuen més o menys positives a l'acabament de la primera sèrie.

4rt.—Pertocant a la *toxicitat* del nou compost, podem afirmar no haver observat en 500 injeccions *cap accident greu*, malgrat haver emprat dosis altes. Havem sí observat algunes reaccions d'intolerància i de sensibilització, sense que aquests petits accidents puguin ésser atribuïts a la toxicitat del producte. En la majoria de casos s'ha tractat de malalts amb trastorns hepàtics o amb sensibilitzacions anteriors, pels quals resulten tòxics tots els productes.

5è.—Es precis continuar les experiències: 1r. per a confirmar la nostra primera impressió. 2n. per a mesurar la seva valor efectiva lluny de la data dels accidents clínics. 3r. per apreciar amb el major nombre de casos més justament i exacta la seva relació entre l'índex tòxic i el de la seva tolerància.