

OBESITAT I LLAGUES VARICOSES TÚRPIDES DE LES CAMES

pels

Drs. Jaume i Jesús Noguer i Moré

1.^a.—Els trastorns circulatoris dels membres inferiors, així com qualsevol alteració bioquímica del medi intern, influeixen considerablement l'etiologia, la patogènia i la curació de les úlceres túrpides de les cames.

2.^a.—L'obesitat és, des dels punts de vista esmentats, una causa d'un interès molt remarcable, perquè produeix o s'acompanya de:

a) *Alteracions químiques humorals*, ja sigui per autointoxicació exògena o endògena (alimentària, estercorèmia, colèma, retenció clorurada i dels productes intermediaris del metabolisme), per hiperglucèmia, per modificacions coloidals o iòniques, per disminució del pH de la sang, etc.

b) *Modificacions endocrino-vegetatives* (alteracions de la tiroide, gonades, fetge, pàncrees, hipòfisi, inestabilitat vegetativa, etcètera).

c) *Modificacions en la sensibilitat celular no electiva*, ja que l'alteració humoral duu aparellada una acció biocel·lulotrópica anormal per excés o per defecte, amb la consegüent alteració del poder defensiu cutani.

d) *Modificacions vaso-motores*, per desequilibri vago-simpàtic, alteració del metabolisme del calci, etc.

e) *Insuficiència cardíaca o renal* per manca de reacció hiperfuncional del cor enfront l'augment de massa somàtica a irrigar, o estat de meiopràgia per esgotament.

3.^a—Quan les llegues de les cames recauen en un individu obès, generalment la baixa de pes juntament amb la normalització metabòlica, milloren o curen espontàniament aquelles llagues, al marge de tot tractamen local.

4.^a—Entre els tractaments emprats per aprimar, sembla que els que obren més favorablement sobre la circulació i èxtasi venós i limfàtic de les cames varicoses, són els que actuen contra l'auto-intoxicació orgànica; el mateix direm quan cal emprar les opoteràpies tiroïdiana i hipofisària.

5.^a—L'índex diferencial oscil·lomètric de les extremitats inferiors estudiat en posicions extremes, es regula progressivament en alguns casos, i de faiso paral·lela a la baixa de pes.

6.^a—El manteniment de la baixa de pes, junt amb els altres mitjans emprats per a la regulació de la circulació — compressió i contenció de les parets venoses per evitar el repòs, mètode bioquímic, etc.—, són indispensables per a evitar el seu retorn o recidiva.