

RESULTATS DEL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE LA PARPELLA

pel

Dr. P. Montanyà i Guasch

Des de l'any 1926 fins a la data actual, en el Servei del Càncer de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigit pel Prof. Guile-
ra, han estat tractats 50 malalts amb epitelioma de la regió pul-
pebral.

L'examen anatomo-patològic practicat en 27 dels casos tractats,
o sigui, en un poc més de la meitat, ens dóna el següent resultat:

Baso cellulars	17
Espino cellulars	5
Mixtos...	4
Glandulars...	1

No ha estat possible la biòpsia en la totalitat dels malalts vistos a causa de la inevitable mutilació que representaria. Examinats, però, clínicament els 23 casos restants, en trobem 17 amb formes clíniques. que generalment corresponen a baso cellulars i 6 que correspondrien a espino cellulars. De manera que, sense temor a equivocar-nos de molt, podem afirmar que són basocelulars el 63 per 100 dels epitelïomes de parpella vistos en el dit Servei.

Amb el concepte actual sobre la ràdium-sensibilitat, aquest fet

ja seria suficient per a assenyalar el predomini d'una determinada terapèutica. Nosaltres, però, hem apel·lat indistintament a diferents recursos i en les formes següents:

1.—Epiteliomes tractats exclusivament amb ràdium = 31.

		<i>Curacions</i>		<i>Resultats Fracassos ignorats</i>
Formes basocel·lulars. ...	21	13	1	7
Formes espinocel·lulars...	6	4	1	1
Formes mixtes	4	3	1	

Tres d'aquests casos han estat curats amb dues aplicacions, i els altres amb una sola aplicació.

2.—Epiteliomes tractats amb ràdium seguit d'electrocoagulació de les recidives. = 7.

		<i>Curacions</i>
Formes basocel·lulars	5	5
Formes espinocel·lulars ...	2	2

En un dels vasocel·lulars, l'electrocoagulació fou extensíssima i seguida de plàstica, portada a terme pel Dr. J. Mas i Oliver, després de tres successius fracassos de la curieteràpia.

3.—Epiteliomes tractats per electrocoagulació i ràdium consecutiu:

		<i>Curacions</i>
Formes basocel·lulars	2	2
Formes espinocel·lulars. ...	1	1

4.—Epiteliomes extirpats quirúrgicament = 2.

		<i>Curacions</i>
Forma basocel·lular	1	1
Epitelioma glandular	1	1

5.—Epiteliomes tractats amb criocauteri: 1, basocellular; curat.

6.—Epiteliomes extirpats quirúrgicament seguits de curieteràpia: 1, espinocellular; resultat ignorat.

7.—Epiteliomes no sotmesos a tractament per diferents causes, 2.

L'estudi comparatiu d'aquests diferents procediments i resultats, tant sota el punt de vista de la curabilitat, com dels resultats estètics obtinguts, ens fa acceptar la curieteràpia com a procediment d'elecció, apel·lant a l'electrocoagulació, fatalment més mutilant, sols en els casos de recidives i en les tumoraracions voluminoses, a fi de facilitar en aquestes l'aplicació del ràdium.