

LA FIBROSITIS. PROCÉS FONAMENTAL D'ALGUNES SÍNDROMES REUMÀTIQUES

DR. RAMON CIRERA I VOLTA

Resum

Concepte.

La fibrositis és una reacció fisiopatològica especial del teixit conjuntiu lax. La relació entre la fibrositis i algunes síndromes reumàtiques radica en la presència constant i en la difusió d'aquest teixit en els òrgans de l'aparell locomotor.

El teixit conjuntiu lax constitueix l'armadura dels principals òrgans del dit aparell. Els vasos arterials, venosos i limfàtics i els filets nerviosos sensitius, motors i vasomotors es distribueixen en la intimitat d'aquells òrgans voltats d'una atmosfera conjuntiva.

El medi intern, doncs, es troba constantment sota la influència dels elements morfològics del teixit conjuntiu lax i les activitats vasculo-hemato-linfàtiques i nervioses dependents d'influències nombroses exercides des de tots els àmbits de l'organisme humà.

Sinonímia. — Etimològicament, els francesos designen la fibrositis amb el mot *cellulitis* o infiltrats *cellulàlgics*. Topogràficament, s'empren els noms de *paniculitis* com equivalent de fibrositis del teixit *cellular* subcutani i la fibrositis dels músculs s'estudia amb el nom d'*emiocellulitis*.

Definició. — La fibrositis locomotriu és un procés complex del teixit conjuntiu de l'aparell locomotor, amb causes predisposants i determinants molt variades i caracteritzat clínicament per produir dolors locals i a distància del nòdul infiltrat o duresa apreciable per la palpació.

Etiopatogènia de la fibrositis

Envasaments intersticials per exsudació o transsudació del plasma amb implantació de gèrmens o fixació de tòxics in situ. Les infeccions més freqüents són la sífilis, la blennorràgia i tots els processos sèptics focals. Els tòxics habituals són els endògens.

Síndromes de fibrositis

Les principals són: les miàlgies, les neuràlgies mal anomenades essencials i les periartritis.

Conclusions

- 1.^a Moltes síndromes reumàtiques no són res més que les manifestacions de la fibrositis de l'aparell locomotor.
- 2.^a El coneixement anatomo-fisiopatològic del teixit conjuntiu lax facilita la comprensió de la fibrositis l. m.
- 3.^a La fibrositis de l'aparell locomotor es produeix sota condicions etiopatogèniques molt variables.
- 4.^a Les principals síndromes reumàtiques per fibrositis són les miàlgies, neuràlgies i periartritis.
- 5.^a El tractament de la fibrositis en general ha d'adaptar-se a cada cas tenint en compte tots els factors que hom consideri fonamentals i coadjuvants.
- 6.^a El massatge és el procediment terapèutic més eficaç sempre que s'administra d'una manera competent i sostinguda.