

SOBRE UN CAS DE MENINGIOMA PARACENTRAL ORIGINAT A LA FALÇ

**DRS. LL. BARRAQUER, M. CORACHAN LLORT, I. DE GISPERT
i LL. CASTAÑER**

Es tracta d'una malalta que sofria crisis convulsives jacksonianes de la cama esquerra des de 15 anys enrera; posteriorment les convulsions es presentaven a la mà i a la cara del mateix costat; mai pèrdua del coneixement. Feia dos anys, cefalàlgies intenses i pèrdua de visió. Signes piramidals a la dreta sense trastorns sensitius, estasi papil·lar bilateral. Cap trastorn afàsic.

Radiografia directa. Imatge de destrucció a regió motora línia mitja.

Ventriculografia. Desplaçament del sistema ventricular cap a la dreta i abaix.

Operació. Extirpació d'un voluminós meningioma adherit a la falç que creixia per sota l'hemisferi i damunt del cos callós. Extirpació completa seguint la tècnica indicada per OLIVECRONA amb ressecció d'una petita zona de teixit cerebral. Curació operatòria en 10 dies. Parèsia que regressa lentament del costat dret. Sensibilitat pràxia i astereognòsia normals. Als 30 dies recuperació de la motilitat del braç, queda la parèsia de la cama que regressa més lentament.